


泰西名醫彙講

二



泰西名醫彙講卷之二

津山 箕作虔儒庠西氏 纂述

胎酸素藥治梅毒經驗

佛蘭西ノ醫思勿實亞烏兒著ス所ノ梅毒全書中ヨリ

抄録ス十八百二十年録行

胡斯骨多氏ハ東印度淳木拔乙地ノ人舍密ノ新元行

ニ精通シ肝臟久炊衝ニ汞劑ヲ行テ大驗アルヲ覈明

ス千七百九十三年適發明スル所アリテ謂消石酸ハ

之ヲ内服セバ其效恐ハ汞劑ニ同カラント此酸ハ其

元素ヲ推原スルニ酸素窒素ノ二瓦斯相配ノ成而其
窒素瓦斯ハ酸素瓦斯ト結交スルヲ太牢固ナラザル
寸ハ其解携スルモ亦難カラザルナリ此時適肝膽病
ヲ得タリ乃躬自其效否ヲ驗セント欲消石酸六十滴
ヲ取水ニ此ヲ以稀開シ一日ニ服シ盡七日ヲ歷テ其
病全瘥是ニ於又此酸ヲ土人ノ梅瘡ヲ病者ニ施試ト
スルニ意アリ乃前ノ服法ノ如之ヲ行ニ及諸汞劑ヲ
用ル者ト其效驗伯仲ノ間ニ在而歐邏巴印度ニ論ナ
ク汞劑ヲ行テ久治效ヲ奏セザル者モ或時ニ此瓦斯
ヲ投ノ痼疾速ニ治シ其偉績莫ニ汞劑ノ上ニ超出ス

ル丁アルニ至且此酸ハ汞劑ノ如惡證ヲ發スル丁ナ
ク長服ノ危篤ヲ爲ノ憂ナシト云印度地方ノ熱國ニ
テハ此新奇ノ藥ヲ行テ梅瘡ヲ療スルニ少モ惡証ヲ
發セズメ太都十五日若クハ廿日ヲ出ズメ全愈又胡
氏淳木拔乙ヨリ友人ニ寄ルノ書牘ヲ讀ニ云此藥或
全績ヲ収ル丁能ザル者アリト雖其証ハ汞劑ヲ行丁
已久メ了寸效アルヲ見ザルノ証ノミ其餘ハ幾多ノ
梅家其証ノ異同ヲ論ゼズ少モ他藥ヲ行丁ナク唯此
酸ヲ用テ完痊可シ二年ヲ歷復再發スル丁ナシト右
ノ如胡氏消石酸ヲ梅瘡ニ經驗シ千七百九十七年越

實木勃尔觚ニ於鋟ノ世ニ刊布ス龍動府窩々尔微弗
 英吉利都府龍ノ銃局ノ鑿呂尔羅ナル者其書ヲ獲テ
 動ニ在ル地名ノ銃局ノ鑿呂尔羅ナル者其書ヲ獲テ
 之ヲ讀其年歐邏巴ニ於此酸ヲ初感染底梅瘡ニ用テ
 更其功否ヲ試ルニ志アリ屈律乙古斯漢鳩氏モ亦同
 上局ノ一名外科ナリ實ニ專此役ヲ尚親自此酸ヲ梅
 瘡ニ施驗ルニ效能神奇ニノ試法的實ナルガ故ニ尔
 來蕩々タル醫流皆此酸ヲ梅瘡ニ用ント擬スルニ至
 斯點亞而多曰此試驗ハ千七百九十七年呂尔羅ガ著
 所ノ謀標銘ノ書中ニ見其書ハ從來不治ノ病ヲ看做
 弃置ノ其治ヲ加サル所以思勿實亞鳥兒氏此經驗ヲ
 引証スル間少脱悞スル所アルヲ免ズ下文ノ掲ル所
 ニ据ニ呂氏ガ用ル所ノ消石酸ハ亞悉儒母尼多立屈

母消石全酸ニ非ソ亞悉儒母尼多呂須母消石亞酸

リ而斯勿實亞鳥兒氏一モ之ニ言及バ按ニ呂而羅ガ

書卷一、百六十九頁ノ文ニ云余ガ此酸ヲ用ト雖其效十全

適全酸關乏スルニ會故ニ唯亞酸ヲ治スルニ於ハ

復疑ヲ容ズ然レ兩酸ハ其功能果皆水銀ト相比準ス

ル計ヤ否更精之ヲ試トスト云々今又兩酸本分ノ質料

全酸ハ酸素八十、分、窒素二十、分、配ノ成、亞悉儒母、消石

多呂須母消石亞酸ハ酸素七十、分、五、分、窒素二十、分、五、分、ヨ

リ聚結スル寸ハ斯兩酸效能ノ差ヲ茲屈律乙古斯漢

ニ開陳セサルハ豈復遺憾ナラスヤ

鳩氏諸酸性藥、效力ノ差異ヲ查明シ且梅瘡ニ酸化汞

按ニ升汞加羅默ヲ行、效驗ヲ成ハ汞ノ能ニ非メ果酸

兒、赤白降汞ノ類

素瓦斯ノ本功タルヤ否ヲ審明セント欲第一ニ消石

酸ヲ試第二ニ飽酸底鹽酸ヲ試第三ニ枸橼酸ヲ試第

四ニ飽酸底鹽酸剥^{ボク}篤^ト亞斯^アヲ試^シ乃其試驗ヲ左ニ開列ス

試^シ消石亞酸^ア第一

一病人、三四日以來、梅瘡ヲ龜頭系^{インキヤウソリ}ニ得タリ消石亞酸一匁ヲ取水二十多ニ和シ一日ニ服シ盡^サシム居^ル丁數日ノ後、其量ヲ增加一匁半ニ至^ル年^キ千七百九十七年^云ヲノ三月十二日、病院ニ詣^リ同十九日、全治ス

一病人、龜頭包皮ニ梅瘡ヲ得^ル丁數處、八日以來又包莖ヲ生ズ日ニ此酸一匁ヲ取水ニ比ニ和シ服セシム三日ヲ過^レ凡太異狀ナシ其分量ヲ加テ一匁半ニ至^ル三

月十二日、來治ヲ請^ヒ、日、瘡愈テ去^ル

一男子、八日來、包皮ニ大潰瘍ヲ得、尿道モ亦少ク稀膿

ヲ漏^ス、此酸一匁ヲ水ニ廿ニ和シ、整日之ヲ服セシム、嗣

其量ヲ増、一匁半ニ至^リ、更ニ加^テ、三匁ニ至^ル、但^シ三匁ヲ服ス

レハ其人^{カラダノコモロモチワルシ}體氣違和シ、且熱ヲ生スルヲ以^テ、其量ヲ減メ

二匁半ヲ與^フ、三月十八日、病院ニ歸シ、四月廿二日全愈

此症ハ傍證アルニ由^テ、其治差^ズ遲^シ

一病人、包皮ニ大瘍ヲ得タリ、日ニ此酸一匁ヲ取水ニ

廿ニ和シ服ス、此ニ由^テ、疝痛ヲ發ス、阿芙蓉一匁ヲ與^フル

丁ニ夕、其後漸次ニ此酸ノ量ヲ増加^シ、日ニ三匁ニ至^ル、復少^ク

餘患ヲ發セズ三月十五日ヲ以テ病院ニ歸シ四月十八日、痊可ヲ告、

試飽酸底鹽酸第二

一病人、八九日來、許多ノ梅瘡ヲ包皮ニ得タリ此酸五滴ヲ水一多ニ和シ服セシムル日ニ三次、漸ニ其分量ヲ倍加テ十五滴ニ至、水ヲ以テ稀過シ服スル日ニ四次、三月十二日、病院ニ歸シ廿日ニノ愈、

一病人、八日以來、龜頭、包皮ニ一潰瘍ヲ得、其底頗深、此酸六滴ヲ取、上方ノ如、服セシムル日ニ三次、瘡形依然トノ變ズルナシ、漸ニ分量ヲ加、十五滴二十滴ヨ

リ乃^テ四十滴ニ至^ル日ニ四次、三月十二日、初病院ニ歸シ
四月初一日、痊可ス

一病人、龜頭包皮ニ梅毒許多ヲ發シ且便毒ヲ患、此酸
八滴ヲ取^リ日ニ四服ス漸^ク其量ヲ倍加^テ三十滴ニ至^ル日ニ
四服、此分量ヲ服^シノ渾身ニ炊衝ノ證候ヲ得タリ一二
日ノ後、刺絡ヲ行^フ一次、瘡勢故ノ如^クニ少^ク減ゼザル
ヲ以^テ更^ニ其量ヲ増^シ五十滴ニ至^ル日ニ四服、三月十八日、病
院ニ來^リ四月廿二日ニ至^テ痊^ユ

補註 便毒ハ三月廿二日ニ潰破シ潰瘍ニ先^ツ十四
日ニメロヲ斂^ム

一病人、龜頭、包皮處々ニ梅毒ヲ得、兼包皮莖便毒ヲ患、此酸八滴ヲ水一多ニ化シ、日ニ三服シ、漸ニ其分量ヲ倍シ、加五十滴ニ至、日ニ四服、此分量ヲ行テ、炊衝ノ諸症ヲ發ス、刺絡ヲ施、速消散ス、四日ノ後、又四十滴ヲ與、日ニ四服、三月十八日、初病院ニ來リ、五月四日ニ愈。

補註 此證、至頑ノ證タリ、陰莖背ノ水脉、疼痛腫脹ス、然、凡久カラズノ消散ス、其便毒モ亦同。

試、枸櫞汁、第三

一病人、梅毒ヲ龜頭ニ得タリ、枸櫞汁一多ヲ水三多ニ化シ、初ハ之ヲ服スル、日ニ三次、其後ハ四次、三月十

二日、初病院ニ歸シ同月廿日愈

一病人、八日許來梅瘡ヲ龜頭包皮ニ得タリ上ノ酸汁

一多ヲ水ニ多ニ化シ日ニ三服ス其量ヲ増加メ日ニ

四多ヨリ八多ニ至三月十二日、病院ニ來翼月廿二日

瘡口歛ル

補註病人、醫院ニ來後五日、便毒ヲ發ス醋酸銻

等ヲ冷水ニ化シ患處ヲ罨其後、越列機^オ的^ルヲ行テ

其部ヲ震スルヲ二三日、梅瘡ニ後、一三日ニメ治

ス

一病人、龜頭ニ大ナル潰瘍ヲ得、其腹股合縫腺モ亦腫

大^ナラ^ス做^ナ日^ニ枸櫞汁一^ナヲ取^リ分^テ四^ニ次若^シ五^ニ次ニ服^シ盡^ス其
腺腫ノ處ハ上^ニ證ノ如^ク蒸^シ濕^シ方^ニ行^フ八^ニ日ニ^テ潰瘍其^ノ口
ヲ^テ歛^ス其^ノ便^ニ毒ハ潰破スルノ勢アリ軟化^セ芭布ヲ帖スル
一^ニ日ニ^テ二^ニ次此ノ如^クナル一^ニ日ニ^テ四^ニ日ニ^テ其^ノ瘍潰破ス居^ル一
二^ニ三^ニ日ニ^テ潰瘍ノ四^ノ周ニ^テ羅斯^ノ狀ノ^ニ焮^シ衝^シヲ發^シ疼痛
腫脹ス日ニ^テ二^ニ次^ニ繻^ノ撒^ノ絲ヲ換^ヘ帖^シ醋^ノ酸^ノ鈔^ノ半^ヲ水ニ
化^セ其^ノ上ヲ冷^シ罨ス枸櫞汁ヲ行^フ故ノ如^ク其^ノ量ヲ增加
日ニ^テ六^ニ多^ニ至^ル三^ニ月十八^ニ日ヨリ病院ニ歸^シ廿六^ニ日ニ
ノ龜頭ノ潰瘍口ヲ完^シ翼^ノ月廿四^ニ日便^ニ毒^ノ痊^ル可^クス

試飽酸底鹽酸剥篤亞斯第四

飽酸底鹽酸剥篤亞斯
ハ^ハ飽^ハ酸^ハ底^ハ鹽^ハ酸^ハ剥^ハ篤^ハ亞^ハ斯^ハ
ハ^ハ飽^ハ酸^ハ底^ハ鹽^ハ酸^ハ剥^ハ篤^ハ亞^ハ斯^ハ
ハ^ハ飽^ハ酸^ハ底^ハ鹽^ハ酸^ハ剥^ハ篤^ハ亞^ハ斯^ハ

林加里ト云フ其元性製法等ハ同寮宇田川榕著
氏著ス所ノ舎密開宗ニ詳ナリ故茲其說ヲ畧メ
ナシ

一病人十日以來、龜頭包皮ニ許多ノ梅瘡ヲ得タリ其
腹股合縫腺モ亦大腫飽酸底鹽酸剥篤亞斯三氏ヲ取
服スル丁日ニ三次、此ノ如ナル丁三日ニメ太效ヲ奏
セズ故ヲ以其量ヲ倍加テ四氏ト爲其後、又増五氏ニ
至日ニ四次、兼越列機の爾ヲ腺腫ノ處ニ行、丁日二一
次、斯點亞而多曰、英吉利龍動府ノ外科、毘而屈氏、初
テ越列機ヲ腹股合縫腺病ニ行、ヲ發明スト云、其
梅瘡ハ十三日ニメ口ヲ歛然、疔腹股合縫腺腫、次第ニ
腫大ス越列機ヲ停テ行、ズ醋酸鉍水ノ冷濁ヲ行、丁日

ニ數次、此鹽ノ分量ヲ增加テ七匁ヲ與、又増ハ匁ニ至
 日ニ四次、便毒潰破シ十二日ノ後、許多ノ膿汁ヲ漏ス
 ノ全、其口ヲ斂、四月廿七日、初テ病院ニ來、五月十九日、
 瘡愈、廿九日、便毒治ス

補註 病人、飽酸底鹽酸剥篤亞斯ヲ行、後、八日ニ、其
 脉ヲ診スルニ一密扭多ノ間ニ九十動ヲ得、其舌ノ
 中心白胎アリ、是ニ於、血少許ヲ瀉ス上ニ煖皮ヲ結、
 血中蠶清分ノ凝成所、其後、斯鹽ノ服量ヲ加五匁ヨ
 リ八匁ニ至、ト雖病人平全ニ、復、他証ヲ得ル、トナ
 シ、凡、上ニ開載スル諸症ハ、太都皆此種ノ酸藥ヲ服

ノ食機盛ニ小便過多ナル者多然ニ此病人ハ毫モ
此證ヲ發スルナシ

一病人、龜頭ニ梅瘡ヲ發スルヲ數處、且包莖ヲ兼此塩
三ハヲ服セシムルヲ日ニ三次、四日ノ後、其量ヲ増加
七ハニ至日ニ四服ス五月三日、病院ニ歸シ十六日、故
ニ復ス

補註 此塩ヲ服スルヲ十日許ニノ病人口渴シ舌ノ
中心ニ白胎アリ然レ食機増盛セズ小便モ亦多ヲ
加ズ其肌ハ平肌ト太異所アルヲナシ

一病人、龜頭包皮ニ梅瘡ヲ得、其包皮太硬大ヲ爲其病

院ニ來ザル前之ヲ患ルヲ殆三週、此鹽ヲ投スルヲ初
ハ四匁、日ニ四服ス、九日ヲ歷後、漸ニ其量ヲ倍加テ五
匁、八匁ヨリ九匁ニ至、日ニ四次、口微渴、舌上微白胎ヲ
除外、餘證アルヲナシ、五月八日、病院ニ來、同月廿九日、
瘥ルヲ告

一病人、八日以來、包皮ニ梅毒瘡ヲ得タリ、此鹽ヲ行、初
ハ六匁、漸、其量ヲ加、八匁ニ至、日ニ四次、五月二日、病院
ニ歸シ、六月廿五日愈

補註 其證候ハ上證ト異所ナシ

一病人、包皮處々ニ潰瘍ヲ得ルヲ已、八日許、此時瘍數

更倍加シ皆速侵蝕ノ大ヲ做ス斯鹽四匁ヲ與後其量ヲ
増テ八九匁ヨリ十二匁ニ至終ニ二十四匁ニ升皆日ニ
四服ス五月八日病院ニ歸シ六月十八日全愈

補註

此病人ハ其天稟稟癰質タルヲ明ナリ其病院

ニ來後七日ニソ口渴シ舌上微胎アリ瘡ノ周圍、羅
斯狀ノ炊赤ヲ爲故ヲ以テ上ノ鹽劑ニ兼幾那一ヲ
與、一日ニ四次、此ノ如ナルヲ十六日、其潰瘍ノ疼痛
減メ殆瘥トシ羅斯狀炊衝ハ全治スルニ似タリ然
レ三日ヲ歷羅斯狀炊衝復發ス又此鹽四十八匁ニ
兼日ニ幾那一五ヲ服セシム此證ノ瘥可スル此ノ

如緩慢スル所以ハ其人ノ天賦瘰癧質タルニ坐ス
 ルヲ疑ナシ然レ余謂幾那ニ飽酸底鹽酸剥篤亞斯
 ヲ配合スル寸ハ初幾那此鹽ノ本分ヲ解剖シ而此
 鹽一解ルニ及ハ却幾那ノ本能ヲ障礙ノ其カヲ伸
 ルヲ能ハラシム此其治スルヲ速ナラザルヲ致所
 以ナリ後ノ此等ノ劑ヲ配合スル者ハ宜意ヲ銳メ
 之ヲ猛省スルアラシムヲ希ガ故ニ爰ニ之ヲ開陳
 ス

一病人數週以來包皮ニ潤大ノ潰瘍ヲ發シ腹股合縫
 腺處々大ニ腫初ハ此鹽六分ヲ與二日ノ後八分ヲ與

日ニ四服ス且醋酸鈆ノ冷濁ヲ腺腫ノ處ニ行、七日ニ
數回六日ニノ潰瘍大佳候アリ但其腺腫ノ處結膿ス
ルガ故ニ此鹽十匁ヲ與、次十二匁ヲ増與、ル七日ニ四
次、此分量ヲ行、七日ニ病人腹痛泄瀉ヲ得タリ夜中阿
芙蓉一匁ヲ與、此鹽ヲ服スル、仍上量ノ如、二日ニノ
上證治シ潰瘍幾痊トス腹股合縫ノ腫處ハ已化膿ス
ルニ似居、七日ニノ潰瘍治ス然、疔腺腫、竟潰破ノ
膿少許ヲ漏出ス九日ノ後、完口ノ些子ノ硬結ヲ遺ス
六月十一日、病院ニ來、龜頭ノ潰瘍、二十二日ニ治、便毒
ハ三十日ニ愈

以上、記スル所ノ十七證ハ皆初感染スル者タリ其人
ヲ查問スルニ皆汞劑若他藥ヲ服スルヲナシ之ヲノ
皆醋酸鉍註上ニ一氏ヲ水ニ多ニ化シ日ニ數回、瘡處ヲ
洗滌セシム別ニ攝生食禁ヲ立ズ但包莖ヲ挾病人ハ
居室ニ籠住シ床中ニ卧ルヲ禁ズルノ其一人ハ唾
腺少感觸スル所アルニ似タリ然嘗吐涎ヲ發スル者
ヲ見ナシ其瘡已愈ル者モ必皆數日藥ヲ服セシム
其食物二種アリ其一種ハ乳ニ蒸餅及薄麥酒一此ヲ
服食セシム其一種ハ肉ニ充分ノ蒸餅蔬菜薄麥酒二
此ヲ與按ニ此等ノ服食ハ皆西人日用ノ食品ニ別
ニ攝生食禁ト云ニ足ズ唯其人ニ應ノ乳ト肉

アルノ差分上ノ治驗ニ据ルニ消石亞酸、枸橼酸汁、飽酸底鹽酸〔飽酸底鹽酸瓦斯〕ヲ水ニ和スハ皆梅毒初染ノ諸證候ヲ治メ少モ吐涎ヲ發スルヲナシ飽酸底鹽酸剥^{ホッ}篤^ト亞^ア斯^スハ就裡最效アリ呂而羅氏其著書ノ附録ニ開メ曰、銃局幾名ノ外科ノ試驗スル所ニ据ルニ消石亞酸ハ初染ノミナラス再染ノ諸證ニ用テ又同効ヲ奏スト以上、四種ノ酸素ヲ胎孕スル藥ヲ行テ發スル所ノ證候ハ食機增長シ小便大利シ口渴舌胎アリ全身ノ機運盛大ヲ爲血液凝結ノ所謂炊皮ヲ結ニ至但飽酸底鹽酸ハ效驗頗峻而枸橼酸ハ之ニ減ス消石亞酸ハ

或内藏ヲ病シムルヲアリ

斯黥亞而多

曰此試驗ニ据考ルニ枸橼酸ノ梅瘡ヲ

治スル其餘ノ三種ト異所ナシ但此酸ハ其素相融

合スル物質ト分解スルヲ頗難其餘ノ胎酸素藥ハ

之ニ反ス

飽酸底鹽酸剥篤亞斯ハ渴ヲ生シ心動脈ノ運動ヲ盛

大ニスルヲ酸精ヨリモ甚シ然尿ノ分泌ヲ催食機

ヲ増盛スルヲ少是ニ由考ルニ諸酸ノ効能ハ要スル

ニ渾身ノ機運ヲ増盛シ兼血ノ蛋清分ヲ凝固セシム

ルニ似リ

華鳥吉里倭兒著、千七百九十一年刻スル所ノ外

二一腫瘍ヲ得其根

ク之ヲ候ニ鼓動ス

日月
來余テが治ラ請病

人自述曰一醫アリ四月廿日肘ニ刺絡ヲ行血大涌出

スルヲ恰波濤ノ如其醫或量ノ血ヲ瀉シ了テ常法ノ

厩泊ノ中ニ大ナル錢貨ヲ

紮緊ス半時余ヲ過テ

其辭大ニ腫起シ皮膚色ヲ變ズ其醫ヲ招診セシム其

紮ヲ解ハ血又大噴^ク噴^ス醫復紮法ヲ施^ス初ノ如明朝
 ニ及其腫倍甚ク^デ辭手皆黑色ヲ爲^ス醫來再^ヒ其紮ヲ解^ス血
 復出^デ碎麥ノ毬布ヲ全辭ニ帖敷スル^ヲ十四日皮色
 故ニ復ス針口潰破スル^ヲ三四日ニノ口ヲ斂^ミ已^ニ其
 處漸^シニ一腫瘍ヲ生ズ醫此腫ヲ認^テ膿瘍ト爲^シ一膏ヲ
 以^テ之ヲ蓋^ヒ且曰十分ニ結膿セバ截開ス宜^ト而其腫次
 第二長大メ遂^ニ今ノ症ヲ成^シ荏苒トメ愈ズ其街内ノ二
 良外科思^ス帝傑兒^ル漢傑^ス詞兒^ルヲ邀^テ其病ヲ議ス二氏皆
 謂^フ其病療ス可^カラザルニ非^ザレ^ニ至篤劇ニノ忽^{ニルカセニ}諸可^カラ
 サルノ證タリト因^テ命^ス余ガ街中ノ醫校ニ歸^リノ醫治

ヲ請シムト云、余乃其腫處ヲ度ニ全狀蛋形ニメ其周圍八拇半、長四拇半、濶三拇半ナリ第一圖甲符ヲ照其崖畧ヲ見ベシ已醫校ニ來後其腫上ニ層々相重叠スル壓帕ヲ施且辟動脈ノ循所ニ沿テ長厚ノ壓帕ヲ安シ底電ノ揆出繃帶漢其傑詞兒ノ外科書ヲ以テ辟手指ヲ并紮住ス此帶ヲノ移動スルヲナクメ良驗ヲ奏セシムルガ爲ニ針ニ絲シテ繃帶相絡ノ邊ヲ迭縫紐ス時々冷醋ヲ用上ヨリ帶子ヲ蘸其辟ハ上ヨリ下ニ至斜ニ漸高カラシムル位置ヲ設大刺絡メ血量ヲ減シ病人ヲメ床中ニ靜養ノ動作セガラシメ且緊忌口セシ

ム

六月初一日、腫處鼓動甚ク、辟疼痛シ、晝夜安カラズ、後
幾日ニノ上證稍減ズ、十三日、十四日、十五日ニ及其證
漸盛ニ、遂ニ繃縛ヲ解去ザル可ラサルニ至、此日盆尼、勃
爾滿扭斯窩々斯多而垤乙奇、樂別、漢傑、詞兒、扶浙木、滿
爾天思等ノ諸先生皆來臨デ、其療法ヲ商議ス、其繃帶
ヲ解去之ヲ見、ニ腫處又長大ノ九拇半ト爲、其皮膚多
剥脫ス、衆咸謂從前施所ノ繃帶、毫モ病ヲ治スルニ益
アルヲナク、而其證手術ニ非レハ愈ニ足サルヲ明知
ス、是ニ於唯輕乾紫ヲ施、緩豆而尼結多ヲ以、辟ヲ鎖皮

膚剥脱全愈ルヲ待テ術ヲ施ス約ハ廿一日、肌膚初テ
完^キヲ告^シ此日術ヲ施ニ先^ツ一^ツ二時、窩^オ々斯^ス多^{トル}而^レ埴^デ乙^イ奇^キ氏、
生阿芙蓉三^ハヲ取^リ病人ニ與^ヘ服セシム前ニ云所ノ盆^{ボウ}
尼^ニ以下ノ諸先生及^ビ内外科ノ諸醫生皆來會ス樂^ラ別^ベ氏、
叔^シ列^レ烏^ウ埴^デ兒^ハ氏介タリ術ヲ施左ノ如^シ
先^ツ緊^シク豆^{トウ}而^ル互^ニ結^{ネツ}多^トヲ螺^チ鎖^シ針口ノ上、腫處ノ正中ニ
於^テ縱^テニ皮膚ヲ割開ス腫處ノ下ヲ距^ル一^ハ拇^ニ始^リ其上
際ヲ距^ル一^ハ拇^ニ止^ム次^ニ雙^ニ頭^ニ辟^テ筋ノ腱樣蔓延體膜ヲ
徐々ニ披開ス此蔓延體ハ即^チ其腫囊ヲ成^ス者ニメ大^ハ雞
卵ノ如^シ之ヲ割開ノ其中ノ畜血ヲ淨清シ輪狀ニ旋^ラ切^テ

本囊ヲ出去其囊ノ外内面ノ狀ハ第二三圖ヲ參觀ス
ベシ是ニ於テ縣輒ノ海縣ヲ水ニ蘸過シ創内ヲ盪滌ス
ルニ動脈ニ一創アリ大柳葉鉞鋒ト恰モ相符ス第四圖
乙符併考可溝路消息子ヲ動脈ノ上下ニ入之ニ循刀
ヲ下凡ハ尿管ヲ線紮スルニ妨アル物ヲバー々截斷ノ
後、脈創ヲ勾針ニテ縫紵シ脈創ノ上下ニ蠟線各二條
ヲ穿テ動脈ノ底面ヲ繞出其最上最下ノ一線ヲ緊紮
ス按ニ動脈ノ底面ヲ繞テ創處ノ上下ニ各二條ノ蠟
線ヲ穿テ入ハ上ノ線通ハ四個而其最上最下
ノ線各一條ヲ聚結シ餘ノ二線ハ之ヲ結サル所以
ハコレヲ以テ不時ノ急須ニ備ント欲スル為ナリ已
紮了後徐ニ豆而屈結多ヲ螺解スルニ血復噴迸セズ

縣撒

六

術ヲ施十密ミ扭ネ

脉前

得

シ

檢

固

遍

解

別氏ノ卓見ニ遵^テ創口ノ上下ヲ割開シ深縫紐スル^ヲ
 二鍼^ヲ且初線^ヲ紮シタル部ノ上下ヲ更緊^ニ紮スル^ヲ二處^ニ
 按^ニ初動脈底ニ穿^テ入^テ出血乃ヤム又創内ニ撒絲ヲ
 未^レ結^ニザル所ノ二線ヲ云^テ出血乃ヤム又創内ニ撒絲ヲ
 填^ニ初ノ如^ク冊子帶^ヲ造^ニ法^ヲ用^テ法^ヲ龍腦精ニ蘸^テ之ヲ繃^ニ
 紮ス龍腦精ヲ行^ニ所以ハ余ガ他^ニ適^{スル}寸豆^ト而^レ尼結^多
 ヲ螺鎖スル^ヲ緊^ニ過^キ其^ノ僻^之ガ為^ニ病^シノラ^レ黑血
 瘀^ニ畜^メ行^{ザル}ヲ治スルガ為^{ナリ}其^ノ僻^初ハ畧^ホ温ナリ
 シ者今ハ乃^チ日^ニ二倍^ニ冷^カニ脈動全絶ス
 廿六日全僻疼甚シ廿七日痛稍減ジ手少^ク温ナリ廿
 九日僻大ニ腫^ニ繃^ニ帶^之ガ為^ニ過^ス緊^ヲ為^ス其^ノヲ^ノ餘裕^{アリ}

ラ使^シトシテ繃帶ノ兩邊ヲ處々剪截ス此日、血又出太
多カラズ三十日、^{リヤフ}辟腫滋多^シ是ヲ以^テ帶子ヲ換、寬繃縛ス
七月初一日、血水交流^ル太多カラズ其後二日ノ間、其量
稍増^ス已^ニノ歇^デ出^デズ五日、創處ニ良膿ヲ結^テ窩^ヲハ斯^ス多^ル児^ノ垓^ニ
乙^イ吉^キ氏^ノ幾^ニ那^ノ煎^ニ二線^ヲ紫^シ油^ヲ加^ル方^ヲ與^ル此日繃帶ヲ更換
ス紫住ノ二線寬縱ノ撒絲ト膠附ス

初六日、初七日、大便通セズ先^ニ緩下劑ヲ行^ヒ次^ニ吉^デ利^リ詞^ス爹^ニ
兒^ノヲ處ス初九日、繃帶ヲ更^テ餘ノ二線モ寬縱ス余、意ヲ
決線ヲ剪斷シ去^ル


初十日、初^ニ線紫シタル部、及^ニ動脈創ヲ縫^ヒ紐シタル兩

際ニ小息肉ヲ生ズ狀腐化シタル腓ノ如^カ第五圖丙丁
符ニ見^ユ此肉ハ創内ニ長息スル餘肉ヨリモ稍^ヤ萎黃色
ヲ帶^ヒ大豌豆ノ如^シ動脈ノ死腐スル處ヲノ速ニ化シ介
シムルガ爲ニ時々^テ的^レ列^ビ並精ヲ點シ乾縣撒絲ヲ填シ
冊子帶ヲ以^テ紮住ス廿二日ニ及^テ創處大ニ歛小ス唯頗
緊ナル輪轉^シ綳帶ヲ換用^ス

六月廿六日ヨリ八月十一日マテ四十又七日ノ間ハ
腕中些^シノ脉動ヲ得ズ此日ニ及^テ脉初^テ復見^ル其後脉勢
漸^シ盛ナリ

廿一日、創悉^ク愈許メ家ニ返^リシム余病者ニ約メ曰^ク其創

第一圖 右肘類動脈傷外形



第二圖




剝剔腫囊視其內外面


第三圖



第四圖 剝去本囊後，鉞鋒傷動脈之痕初見



第五圖 小息肉生於脉創之上下



新愈ト雖掉運未故ニ復セズ時々就診視シ其全治ヲ
謀可止九月廿五日ニ及其病盡痊一切運用皆故ノ如

是ニ於初會議シタル諸先生ノ家ニ詣謝セシム

附冊子帶

傑外詞兒第一卷附錄外科器械圖說

造法并圖

此帶子ハ三箇ノ

木絲片ヲ以製ス其縱徑ハ傷處ノ一又半ノ長ニメ

横徑ハ創ノ形ニ應メ大小スベシ其兩中ハ三層ニ

重テ子春春ノ二號ノ如粗之ヲ縫合ス其三層ノ兩端


ヲ切縫際ノ側ニ至毎端各三頭ト爲但ス其切處ハ每

層一直線ヲ爲スヒトメ一上一下一濶一狹相錯於メ六

箇ノ夏秋冬符ヲ爲ヲ要ス此創上ニ傳帖メ其每頭

冊子帶
ブークバンド

ブーケバンド



ノ切際ニ空隙ヲ遺^ズ丁莫^シムルガ爲ナリ又繚片ノ
横徑ハ外ヨリ内ニ向^テ毎層必^ズ短^キ一拵ナルベシ故^ニ
最外ノ一層ハ最^モ長^シ最内ノ一層ハ最^モ短^シ
着法先^ツ帶子
ヲ取^リ證ニ應^ルノ單水若^ク水醋若^ク水燒酒ニ蘸透ス畢竟
患處ニ觀^ミ帖スルニ取^ルノミ是ニ於^テ帶子ノ兩中ヲ上
臂ナラバ後面下臂及^ビ股ナラバ外面脚ナラハ内面
ニ帖シ傷處ノ周^リニ各^ク其兩端ノ頭緒ヲ横緊帖ス但^シ
先^ツ其最内層ノ中心ノ一頭ヲ帖上ノ次ヲ逐^テ其餘
頭ヲ帖スベシ第二三層モ亦之ニ準ス**主用**外科者
流^ル太畧タ^バ此帶子ヲ復骨傷ニ用^ルルノミ余^ガ傑^ク詩^ル兒^ル
オホムキ
自^レ言^フ

ハ乃股脚骨單傷ニモ亦之ヲ施、毎奇效ヲ収

子宮血崩行、タム芥木ホム封ホシ經驗四則

本六則ヲ節ス、即白ワリ瓦ガ而今其四蘭

達多著

第一驗 千七百八十四年、十月十二日、余ヲ邀イヒ、木氏

ノ令内ノ疾ヲ診セシム其人、年ニ紀廿一歲、姪ニ娘スル

已六月餘之ヲ望、ニ精神昏沉、人事ヲ省セズ、短床ノ上

ニ僵卧ス、看侍人余ニ向テ話ノ曰、婦一時半以還、陣疼ヲ

得余ノ來ニ先ツ少頃ニカビヤシノ其疼止ミ乍チ眩暈大血崩ヲ發

ス、止其陰中ヲ候、ニ子宮口、硬大ノ開哆シ血其口ヨリ

注瀉シテ止ズ、脉小弱、氣息蹇澁ス、頻ニ水醋ヲ面ニ發

ス稍知^ル所アリ少頃ニノ血崩復發^タシ病人又昏沈ス子宮口ノ狀ヲ以考^ルニ此危篤ノ際ニ臨決^ダ胎児ヲ分娩セシムルニ由^{ヨシ}ナキ寸ハ速ニ其大血崩ヲ遏^ムルノ利^リルニ如^カズ乃^ハ縣帕ヲ摺折^リノ四層ト爲^シ冷醋ヲ以^テ蘸腹上ニ帖ス知覺少^シク生ジ崩微^シク止^ム又冷醋ヲ以^テ其面ヲ灌洗^シ新ニ又腹上ノ帕ヲ醋ニ蘸帖ス已^ニノ病人腰腹疼痛ヲ叫^ハ余其子宮口豁開^ルノ分娩スルヲ望^ム然^レ其宮口全^ク故ノ如^ク少^シモ變化スルヲナキ寸ハ分娩スル能^ハサルヲ必セリ況^ヤ其血崩止ザル一既^ニ四分時余ニノ今又更^ニ増劇スル寸ハ宜^シク荅^タ木封^{ボン}ト^ト度^ト儒^セ按^ルニ荅^タ木封^{ボン}ハ蘭^ニス

スルノ義ナリ蓋、繇帕、若、苧麻等ヲ水若、醋中ニ蘸透シ
摺折若、緊捏ノ子宮、腔ニ内、或、層々相襲テ腔内ニ填满
シテ出血ヲ遏絶スルヲ云、又他部ノ創傷ニモ之ヲ行
ヲ以テ創内ニ填平スルヲアリ往々諸書ニ載ス
ベキノ證ナリ乃、身畔ノ手帕ヲ取醋ヲ以蘸透シ緊捏
ノ一塊ト爲累々相襲テ腔内ニ入上ハ宮口ヲ撐兩股
ヲ緊合シ兩脚ヲ椅子上ニ搭シ床上ニ平卧セシム此
治法ニ由神經新ニ一異感動ヲ生ジテ全身戰慄シ精
神完復ス赤蒲桃酒一盞ヲ服ノ後、微々睡寐ス四分時
ヲ歷小便窘迫ノ眠覺余此時ニ乗ノ荅木封ヲ出去ト
欲少ク之ヲ探バ荅木封、血塊ト相連結ノ出次血崩又
大發ス余之ヲ扶掖メ床ニ上シメ又、初ヨリモ小ナル

荅木封ヲ造脛内ニ填塞シ幾那粵幾斯化水ニ舍電阿
芙蓉液、綠礬油ヲ伍メ之ヲ投ズ一時ノ後病人微々打
睡シ蒸氣恰好宣發シ脉弱ト雖倫アリ荅木封自脫落
シ血復出ズ前藥ヲ行ハ數日ニシテ一二週ノ後精力故
ニ復シ三月ヲ歷テ男児ヲ誕ス其隨隨橢圓ニシテ子宮
ノ右側ニ牢着シテ幾子宮口ノ外ニ挺出シ臍帶其側
面ニ植立ス此畸癈ナル位置ハ實ニ其第六月ノ血崩
ヲ發スル所以ナリ産後惡露恰好下精力頓ニ復ス其
明年ニ及再懷孕シ少ノ異證ナクノ月滿テ分娩ス
第二驗 遏漢所倫健ハ密多而勃爾觚名地ノ内科產科

ナリ千七百八十五年八月、一婦人ノ許ニ延請セラ
 其婦、年紀三十許、已ニ兒ヲ誕ス今又、妊ノ方ニ五月十
 リ一日晝間少ク血漏ヲ得、夜ニ及頗甚ク夜半ニ至、滋
 劇ク過氏詣診スルニ及ハ病人心神已昏冒シ汚血狼
 藉ノ中ニ僵卧ス其脉小弱、氣息短促、瘰癧ノ摘掣アリ
 テ其死期已迫リ子宮口洞開ノ大思多乙府兒按ニ錢貨ノ名
 ノ如扶所斯名人ノ術ニ据子宮口ヲ開拓セント欲按ニ虞儒
 扶所斯ハ術ハ未ダ其那樣タルヲ詳ニセズ蓋之然血
 崩滋甚ク諸證蜂起ス且其術ヲ施了マデハ半時若一
 時ノ久ヲ須ルガ故ニ其間ニ病人ノ精力竟耗竭シテ

生機熄滅セシトテ恐^レ是ヲ以其術ヲ止^テ行ハズ荅木
封^ボヲ施^テ之^ヲ過^{ント}欲^ス乃^チ手帕ヲ醋中ニ蘸^シ勉^テ深^ク脰
中ニ納^メ時々舎^セ電^デ阿芙蓉液ヲ與^フ服セシム丑半牌ノ後
手足本然ノ温ニ復^シ病人知覺スル所アリ寅牌ニ及
決睡ス夜戌牌荅木封^ボヲ出^シ去^リ之^ヲ更新セント欲^ス然^レ血
崩早^ニ已^ム閉止スルヲ以^テ復^タ之^ヲ用^ヒズ床内ニ静養シ其明
日午後安産ス惡露恰好^ニ下^リ三日第六日病盡瘥^テ家
事ヲ操作スル^ノ平時ノ如^シ
第三驗 亞^ア乙^イ過^{アル}而^レ列^レ別^ベ氏^スハ思^ス的^テ炎^{エン}別^ベ尔^ル健^{ケン}地^チノ外科
産科ナリ千七百八十五年十一月十八日^ニ炎^{エン}別^ベ氏^スノ婦

ノ産難ニ邀延婦ハ初産タリ子宮口洞開シ微ナル陣
 疼發スル寸ハ一膜子宮口ヨリ突出ス外面ハ至縦緩
 ナリ遏而列別氏ノ未到ガル前ハ努力頗盛ナリ已ノ
 漸減ズ唯其未破漿セザルガ爲ニ幸ニ詳ニ其胎児ノ
 恰好ノ位置ヲ候ヲ得タリ其替遲ノ未分娩セザル所
 以ハ胎衣按ニ即胎外ノ薄膜ヲ云云宛隨ニハ非ス膠固ニノ破綻シ難ガ
 故ノミ乃意ヲ決ノ其膜ヲ切開ニ未ニ密扭多ヲ過ス
 ノ見胎宛隨ト俱ニ生而血崩大作遏而列別氏手ヲ子
 宮内ニ刺候ニ其口放開メ些ノ手ヲ遮ヲ覺ズ指ヲ以
 宮内ヲ摩澤ノ其知覺ヲ興以其口ヲ歛シメント欲レ

凡其機運廢絶ノ絶手ヲ箝頓スルヲナシ此時ニ方病人意識全、胃味ノ血液暴注スルヲ波濤ノ如シ生力瞬間ニ熄滅セントスル勢アリ是ニ於自其手ヲ抽去、苧麻少許ヲ取テ醋ニ湿、勉深ク子宮内ニ填满シ其後手ヲ以其腹ヲ按スルニ子宮未、斂束セズ故ヲ以更許多ノ苧麻ヲ醋ニ蘸、腹上ニ帖シ一二密扭多ノ後、又上種ノ荅木封ヲ換、納頃之ニノ病人知覺初テ復シ腹痛甚キヲ訴、又其腹ヲ按メ明ニ子宮ノ斂束スルヲ候知ス其時、血崩減シ二時許ヲ過ル後、血ト荅木封ト糾結ノ脱ス強壯劑ヲ行、丁三週ニノ始テ產褥ヲ起

第四驗

伊越氏ノ妻

千七百八十六年初妊娠ス臨盆

ノ際、產婆之ヲ療ス此ヨリ以還、子宮脱ヲ得タリ明年

七月、余カ診ヲ請、子宮脱ノ腔ノ大唇外ニ在大初生児

頭ノ如之ヲ納レバ乃歛ト雖復脱下ス尋常ノ子宮環

海綿枕

按ニ子宮環ハ腔中ニ納レ子宮脱ヲ上ニ撐ル具

スルニ

皆之ヲノ本所ニ留シムルヲ能ス凡孕婦ノ本

病

按ニ惡ニ兼テ子宮環等ヲ施、效ナキ子宮脱ヲ得ル

者ハ往々目撃スル所ニノ實ニ受胎ノ一候タリ其後

七八週ニ及テ子宮果復脱セズ羞骨上ニ升ヲ以其懷孕

タルヲ確證ス千七百八十八年、第一月十七日、産ニ臨

是ニ於余ヲ招、產婦大陣疼ヲ得、子宮漸ニ開哆スルヲ
二時半餘ニノ薄膜破綻シ兒頭子宮頸ト俱小骨孟内
ニ下降ス努カスルヲ少選^{ビラウ}ニノ陰戸口ニ臨、遂^ニ腔ノ大
唇ニ達ス子宮口ノ開大スル者、其大畧^{オホ}子宮環ノ如余
二指ヲ以^テ宮口ト兒頭ノ間ニ挿入シ陣疼發スル毎ニ
子宮口ヲ拓開シ且勉^ムテ子宮頸ヲ上ニ捺送ス四分時
ノ後、兒頭全^ク子宮外ニ娩出ス臍帶兒頭ヲ絡^ヲ二匝、指
ヲ以^テ撮起兒頭ヲ踰^ルテ之ヲ解脫シ分娩セシムルヲ常
法ノ如^シ已^ニノ臍帶ヲ紮斷スル間、倏^ニ血崩ヲ得、病人全^ク昏
沉ス臍帶ニ循^リテ指ヲ刺^ス子宮中ヲ候、ニ娩隨ノ半截子

宮底ニ膠附シ其底反墊^{ヒタカクツル}ノ挽隨ト俱其頸側ニ在而其
 頸ハ方ニ垂降^レ腔唇ニ臨^ム乃手心ニ挽隨ヲ承^ル之ト俱宮
 底ヲ上ニ支^ヘ起^シテ子宮ノ全質ヲ勉^テ上推送シ其斂束
 ラ促^スガ爲^ニ手ヲ其内ニ留^ム其挽隨ノ大半ハ已^ニ宮底ヲ
 離^ルト雖餘猶^モ脱セザルヲ以^テ子宮之ニ妨^ラレテ自斂束
 スルヲ能^ズ血崩仍^チ故ノ如^クニ止^ムナキヲ知^リ乃宮内
 ニ留^{タル}右手ヲ以^テ其膠附ノ處ヲ剝離シ左手ヲ以^テ臍
 帶ヲ持^ソ挽隨ヲ外ニ掣^キ出^シ仍^チ右手ヲ陰内ニ留^テ其斂藏
 ノ狀ヲ觀^シト欲^ス然^レ反墊ニ由^テ麻木シタル子宮底再^ヒ其機
 運ヲ憤起スルヲ能^ズ病人精神昏沉シ血脈管開哆ノ

處ヨリ溢泄スルヲ恰波濤ノ崩ル、ガ如是ニ於答木
封ヲ行ト欲手帕ヲ取側ノ冷水桶中ニ蘸過シテ子宮
上身ヲ填塞ス精神乍甦其腹ヲ候ニ子宮モ亦動運ヲ
生ノ収縮スルヲ覺此術ヲ施ト雖侍者未嘗之ヲ悟ズ
ノ其病人ノ呻吟スルハ挽隨ヲ拽出スルガ故トノミ
思ヘリ已術ヲ施了ニ及傍人ニ向其已危篤ヲ免、ヲ
開諭シ而再三其腹ヲ按ノ自其子宮既斂束スルヲ證
明ス然_レ在其實ヲ語寸ハ物議沸騰スルヲ以答木封ヲ
内、ヲ知シノス寬陰部ヲ繃縛シテ其頭ヲ鍼紉シ答
木封ヲ脱セザルヤウニ看護ノ病床ニ上シメ時々發

作スル眩暈ヲハ急ニ忽弗滿鎮痛液、舍電阿芙蓉液ヲ
與、余ガ居病家ヲ距^{サレ}テ遠カラズ故急ニ之ヲ辨スル
ヲ得タリ、病人輕々ニ睡ヲ催、一時許ヲ歷、病人以爲大
血塊ヲ下^スト而其實ハ荅木封^{ボク}ノ脫下スルタルヲ知ラズ、
病人此ニ由^リ眠覺、此時精神已頗快爽ス、其後心識漸ニ
復シ調攝スル^ヲ三週ニノ病床ヲ徹ス、其床中ニ靜養
スル間ハ子宮脫セズ起家事ヲ操作スルニ及復^タ腔内
ニ脫下スル^ヲ一拇半許之ヲノ更大脫セガラシメ且
其已脫スル者モ亦勉^メテ上ニ支起^スガ爲ニ海綿枕ヲ腔
中ニ行^レ然^レ病^レ人之ヲ帶ル^ヲナシ、其年九月又妊スニ

水桶ヲ擔^テ窖^{アタラシク}級ヲ升^リ子宮復大^タ脫スル^ヲ初孕ノ時ノ如^シ
第四月ニ及^テ子宮本位ニ復シ其脫治ス千七百八十九
年、四月十三日、安産ス臨盆ノ際、子宮頸少^ク腔中ニ脫
在ス然^レ厄惡証アル^ヲナシ是由^ニ前^テノ惡證ハ子宮脫ノ
發スル所ニ非^ズノ臍帶短促ニ由^テ生スル^ヲヲ知^ル

泰西名醫彙講卷之二 畢

蘇西公國書牘
卷之三
三
蘇西公國書牘

